


### 2.3.5.- *Gonorrea*

La *gonorrea* es una *Infección de Transmisión Sexual* (ITS) producida por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*:



Bacteria de la Gonorrea

Pertenece al grupo de los *diplococos* porque suelen agruparse en dos o más bacterias.

La *gonorrea* es una infección del *epitelio de la uretra*, el *recto*, el *cérvix*, que puede producir *bacteriemia* (diseminación de bacterias por todo el cuerpo cuando alcanzan el torrente sanguíneo) y por lo tanto otras enfermedades.

Las mujeres pueden *tener la bacteria* durante semanas o meses sin *mostrar síntoma ninguno*. Muchas veces son *diagnosticadas tras estudiarlas* por ser la *pareja sexual* de otra persona *contagiada*.

Las bacterias proliferan en *áreas corporales húmedas y cálidas*, incluso el *conducto* que transporta la orina fuera del *cuerpo* (uretra). En las mujeres, las bacterias se pueden encontrar en el *aparato reproductor* (que incluye las trompas de Falopio, el útero y el cuello uterino). Esta bacteria puede incluso *proliferar en los ojos*.

#### *Transmisión*

Se puede propagar por cualquier tipo de *actividad sexual*. Se puede contraer por contacto con la *boca*, la *vagina*, el *pene* o el *ano*.

## ENFERMEDADES FÍSICAS Y SU CURACIÓN

Hay que tener en cuenta que para **contraerlo** o **transmitirlo** no implica que tenga que haber eyaculación, con el simple contacto con las partes anteriormente mencionadas es suficiente para que se dé **el contagio**.

La mayor probabilidad de sufrir contagio por **adolescentes** o **mayores** se produce cuando:

- a) Tiene **múltiples** compañeros **sexuales**.
- b) Tiene un compañero con **antecedentes** de cualquier enfermedad de transmisión sexual.
- c) **No utiliza condón** durante la relación sexual.
- d) Es **bebedor** y **adicto** a las **drogas**.

La gonorrea es una Enfermedad de Transmisión Sexual que continúa siendo considerada un problema de Salud Pública importante para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

### **Síntomas**

Los síntomas en los **hombres** comprenden:

- a) **Dolor** y **ardor** al orinar
- b) Aumento de la **frecuencia** o **urgencia** urinaria
- c) **Secreción** del pene (de color blanco, amarillo o verde)
- d) **Abertura del pene** roja o inflamada
- e) Testículos **sensibles** o **inflamados**
- f) Dolor de **garganta**

Los síntomas en las mujeres pueden **ser muy leves** y se pueden **confundir** con otro tipo de infección. Estos síntomas comprenden:

- a) Flujo **vaginal**
- b) **Dolor** y **ardor** al orinar
- c) Aumento de la **micción**

- d) Dolor de *garganta*
- e) Relaciones *sexuales* dolorosas
- f) Dolor *intenso* en la parte baja del abdomen (si la infección se disemina a las trompas de Falopio y al área del estómago)
- g) *Fiebre* (si la infección se disemina a las trompas de Falopio y al área del estómago)

Si la infección se *disemina al torrente sanguíneo*, los síntomas abarcan:

- a) *Fiebre*
- b) *Salpullido*
- c) Síntomas *similares* a la artritis

Los síntomas de *gonorrea* generalmente aparecen de *2 a 5 días* después de la *infección*. **En el hombre** los síntomas pueden tardar en aparecer hasta un *mes*.

Algunas *personas no presentan síntomas* pueden desconocer por completo que han adquirido la enfermedad y, por lo tanto, no buscan tratamiento.

Síntomas de la *gonorrea* en *niños* y *lactantes* comprenden:

En *las lactantes y las niñas*, la infección puede hacerse *patente por irritación, edema* (retención de líquido) y *eritema* (enrojecimiento de la zona) de la vulva. Puede aparecer *exudado purulento* y *proctitis* (la proctitis es la sensación de necesidad de defecar, debida a una inflamación de la zona).

En niños y niñas, la infección por gonorrea sólo suele contagiarse mediante el *abuso sexual* por parte de adultos.



### *Tratamiento*

Se *utilizan muchos antibióticos diferentes* para el tratamiento de este tipo de infección. Usted puede recibir una *dosis grande de antibióticos orales* o tomar *una dosis más pequeña durante siete días*.

Los *casos más graves* pueden requerir *hospitalización*. Los antibióticos se administran primero por *vía intravenosa*.

Aproximadamente la mitad de las mujeres *con gonorrea* también están infectadas con *clamidia* (infección de transmisión sexual). La *clamidia* se trata al mismo tiempo como una *infección de gonorrea*.

Usted necesitará una consulta de control *7 días después* si se presentan síntomas como *dolor articular, salpullido en la piel o dolor abdominal o pélvico* más intenso.

Aunque se trate de una enfermedad considerada *curable*, es cierto que en los últimos años están apareciendo *cepas resistentes* a muchos antibióticos. Esta resistencia está siendo estudiada por la OMS, que lo considera un problema importante que debe ser cortado de raíz.

### *Prevención*

Puesto que la gonorrea se trasmite a través de las relaciones sexuales, la mejor forma de *prevenirla* consiste en *abstenerse de mantener este tipo de relaciones*. Si se mantienen relaciones sexuales con más de *un compañero sexual* o con personas que tienen más *de un compañero sexual*, se incrementa el riesgo de contraer la enfermedad.

Los *preservativos* reducen el riesgo de contraer ETS. Los preservativos de látex ofrecen una mayor protección que los elaborados con membranas de *origen natural*. Los *preservativos femeninos*, fabricados con *poliuretano*, también se consideran una protección eficaz contra las ETS.

Aunque los anticonceptivos orales no aportan ninguna protección contra las ETS, *pueden ofrecer cierta protección* contra la *enfermedad pélvica inflamatoria*.

## ENFERMEDADES FÍSICAS Y SU CURACIÓN

Las duchas *vaginales incrementan el riesgo* de que una mujer contraiga una ETS, porque pueden alterar la *flora natural de la vagina* y empujar las *bacterias hacia partes superiores* del aparato reproductor.

Una *mujer embarazada* que padezca una ETS puede *transmitírsela al bebé*, incluso aunque la futura madre no *presente ningún síntoma*. Las pruebas de cribado sobre algunas (pero no todas) ETS forman parte de las atenciones *prenatales sistemáticas*.

Algunas *Enfermedades de Transmisión Sexual* como *gonorrea, clamidia* y *sífilis* son ocasionadas por bacterias, y por lo general, los antibióticos son un tratamiento más eficaz, aunque muchos pacientes no saben que están infectados y pueden contagiar la enfermedad a otras parejas. La *disponibilidad de tratamientos* significa que la necesidad de tener *vacunas contra estas enfermedades no es una prioridad*, aunque la resistencia cada vez mayor de la gonorrea a los antibióticos puede conducir a un *cambio en las prioridades*.

Enlazar, *vía online*, para visualizar los videos

Video: La Gonorrea. Causa y síntomas

<https://www.youtube.com/watch?v=v1-1xh8DFs4>

Video: La Gonorrea. Causa y síntomas

<https://www.youtube.com/watch?v=TU6K7k3JadA>

Video: La Gonorrea y la infertilidad en la mujer

<https://www.youtube.com/watch?v=HdvIBWtV9o0>

Video: La Gonorrea y embarazo

<https://www.youtube.com/watch?v=UCfcaCa4ZDY>

Video: La Gonorrea y el pene

<https://www.youtube.com/watch?v=kVfWbtgx52o>

Video: Herpes genital

<https://www.youtube.com/watch?v=uUUgbhk4B9s>

Video: La Gonorrea. Causa y síntomas

[https://www.youtube.com/watch?v=wqqHdNLM\\_6g](https://www.youtube.com/watch?v=wqqHdNLM_6g)

### *Enlaces*

<http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/gonorrea/tratamiento-de-la-gonorrea-4951>

<http://www.quierosaber.org/ets/gonorrea.html>

[http://kidshealth.org/parent/en\\_espanol/infecciones/gonococcal\\_esp.html](http://kidshealth.org/parent/en_espanol/infecciones/gonococcal_esp.html)

<http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/gonorrea/complicaciones-de-la-gonorrea-4950>

<http://youngwomenshealth.org/2005/10/06/la-gonorrea/>

<http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/gonorrea/gonorrea-4947>

<http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/gonorrea/sintomas-de-la-gonorrea-4948>

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007267.htm>

